
Impfplan Österreich 2021





Legende

- Impfung empfohlen kostenfrei
- Nachhol-Impfung empfohlen kostenfrei
- Impfung empfohlen nicht kostenfrei
- Nachhol-Impfung empfohlen nicht kostenfrei
- Nachhol-Impfung empfohlen zum vergünstigten Selbstkostenpreis

- **1** 1. Dosis
- 2 2. Dosis
- **3** 3. Dosis
- **4** 4 Dosis
- B Boosterimpfung
- 13 13-valente
 Pneumokokkenimpfung
- 23 23-valente Pneumokokkenimpfung

Hinw

Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht. Details siehe Kapitel der jeweiligen Impfung bzw. entsprechende Fachinformation.

Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfungen bei Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden.

- a Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten
 32. Lebenswoche (Rotateg, 3 Dosen)
- **b** Wenn nicht zuvor erfolgt, Impfung gegen Pertussis spätestens bei Schulaustritt
- c Nach Grundimmunisierung und mindestens zwei Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter weitere Impfungen nur bei Indikation.
- d Auffrischung ab dem vollendeten 7. Lebensjahr
- e Kinder mit Risiken bis zum vollendeten 5. Lebensjahr kostenfrei
- f Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen
- g Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff

- HPV-Nachholimpfungen zum Selbstkostenpreis für die Dauer der COVID-19 Pandemie bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. Ab vollendetem 15. Lebensjahr 3 Dosen
 - Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 8. Lebensjahr (tetravalente Lebendvakzine) bzw. bis zum vollendeten
 9. Lebensjahr (tetravalenter Totimpfstoff) 2 Impfungen im
 Abstand von mindestens 4 Wochen. Bei eingeschränkter
 Impfstoffverfügbarkeit bei Erstimpfung nur eine Dosis
 verabreichen (und auf die 2. Dosis nach 4 Wochen verzichten,
 off label). Danach 1 jährliche Impfung ausreichend

Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.